

Теорема Ейлера

Давайте боротися за те, щоб успішність кожного школяра була вищою за середню!

„Читайте Ейлера, читайте Ейлера, це наш спільний учитель.“

Лаплас

Теорема Ейлера. Якщо $(a, m) = 1$, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Якщо $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$, то

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

Чому остання формула правильна? В попередній домашній ви вже мали навчитися доводити, що $\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p - 1)$. Оскільки p - просте, то це має бути дійсно просто. Так і є. Трохи складніше зрозуміти, чому для взаємно простих m і n виконується $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Тепер чому теорема Ейлера правильна? Доведемо її за аналогією до теореми Ферма. Розглянемо усі остачі за модулем m , що взаємно прості з m . Скільки їх буде? Правильно. Назвемо ці числа $m_1, m_2, \dots, m_{\varphi(m)}$. Далі візьмемо оте a , що взаємно просте з m , і розглянемо числа

$$m_1 a, m_2 a, \dots, m_{\varphi(m)} a.$$

Усі вони продовжують бути взаємно простими з m і усі дають різні остачі за модулем m . Чому? Ну, далі, думаю, ясно.

1. Довести, що $7^{80} - 3^{40}$ ділиться на 100.
2. Чи існує таке $n \in \mathbb{N}$, що 3^n матиме у своєму записі принаймні 2012 нулів? (Новий погляд на відому задачу).
3. Довести, що, якщо n — непарне, то $n \mid 2^{n!} - 1$.
4. Довести, що для усіх $k \in \mathbb{N}$ існує $n \in \mathbb{N}$ таке, що $2^n - 1$ має принаймні k простих дільників.
5. Довести, що для усіх $n \in \mathbb{N}$ число $19 \cdot 8^n + 17$ не є простим. (Я теж не знаю, до чого тут теорема Ейлера).

6. $p > 5$ — просте. Відомо, що $p \mid a^4 + a^3 + a^2 + a + 1$. Довести, що $5 \mid p - 1$.
7. Чи буде простим число $257^{1092} + 1092$?
8. Довести, що для будь-якого простого p існує нескінченна кількість чисел виду $2^n - n$, що діляться на p .
9. Довести, що якщо n — непарне, то $n!! \mid 2^{n!} - 1$. ($n!! = n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdot \dots$). (Це вже буде трохи складніше, ніж задача №3.)
10. Довести, що, якщо $n \geq 2$, то $n \nmid 2^n - 1$ (n не ділить $2^n - 1$).
А тепер найцікавіше: наступна задача теж має відношення до теореми Ейлера.
11. У квадраті відмітили 20 точок і відрізками, що не перетинаються, з'єднали їх між собою і з вершинами квадрата так, що квадрат розбився на трикутники. Скільки вийшло трикутників?

Я вирішив, що на 2 тижні цього вам буде замало, тому додаю ще трохи задач. І ці задачі уже точно ні в кого не мають викликати труднощів.

1. Довести, що $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ ділиться на 133.
2. Знайдіть усі натуральні n , для яких $n2^n + 1$ ділиться на 3.
3. Взяли 100 чисел. Серед їхніх усіх можливих добутків по два числа виявилось 1000 від'ємних. Скільки серед цих чисел було нулів?
4. При якому a многочлени $x^4 + ax^2 + 1$ і $x^3 + ax + 1$ мають спільний корінь?
5. Послідовність $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ визначається так: $a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Знайти a_{2012} .
6. Доведіть мультиплікативну властивість для $\tau(n)$ — кількості натуральних дільників числа n . Тобто, що, якщо $(m, n) = 1$, то $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$